

BANDANA 750 WG

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
— CARIBE S.A.S. —

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

REGISTRO NACIONAL ICA: 2660

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Tricyclazole: 5-methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole 750 g/Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

GENERALIDADES

BANDANA 750 WG es un fungicida triazol con acción preventiva, curativa y sistémica que inhibe la biosíntesis del ergosterol y de la melanina en la pared celular de los hongos patógenos. Este producto es absorbido rápidamente por las raíces y hojas y transportado hacia el extremo de las hojas a través del xilema y el apoplasto ascendentemente.

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS | P.C. | P.R. |
|---------|--|----------|---------|---------|
| ARROZ | Pyricularia (<i>Pyricularia oryzae</i>) | 300 g/Ha | 30 días | 4 horas |

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Agregue agua en el tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien mediante agitación mecánica. No es recomendado hacer mezclas con sustancias alcalinas. Se recomienda utilizar equipos convencionales con boquillas TX1, TX2, o sus equivalentes.

Aplicar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

