

BATUTA SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC

— CARIBE S.A.S. —

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

TEBUCONAZOLE 100 g/L

TRIFLOXYSTROBIN 200 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3181

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

BATUTA SC es un fungicida preventivo-curativo por las características que le dan sus ingredientes activos, Trifloxystrobin pertenece al grupo de las estrobilurinas; actúa como un inhibidor de la respiración afectando la interrupción de la transferencia de electrones en las mitocondrias de las células fúngicas. El Tebuconazole pertenece a la clase química de fungicidas Triazoles. Se ha demostrado que su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la desmetilación en la posición C-14 en la biosíntesis de esteroides fúngicos.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	P.C. (DIAS)	P.R.	LMR
ARROZ	MANCHA NARANJA (<i>Gaeumannomyces graminis</i>)	1.0	3	4 HORAS	Tebuconazole: 1.5 mg/kg Trifloxystrobin: 5 mg/kg
TOMATE UCHUVA* TOMATE DE ÁRBOL PIMENTÓN BERENJENA AJÍ LULO	TIZON TEMPRANO (<i>Alternaria solani</i>)	0.5	3	4 HORAS	Tebuconazole: 0.7 mg/kg Trifloxystrobin: 0.7 mg/kg

P.C.: Período de Carenia: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola.

P.R.: Período de Reentrada: intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de personas al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Realizar una (1) aplicación de manera preventiva cuando se presenten condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad, o con la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad en el campo. Para evitar la resistencia, siga las instrucciones del comité de acción de resistencia de fungicidas FRAC y utilice productos con mecanismos de acción diferente en las aplicaciones sucesivas.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Antes de efectuar mezclas debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad) y Fito compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

Se puede mezclar con coadyuvantes siguiendo las recomendaciones del fabricante. BATUTA SC en las dosis y frecuencia recomendables, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de Fito compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO