

BERRACO 50 SG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

Berraco 50 SG

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 8012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Imidacloprid 500 g/Kg + Beta-cyfluthrin 50 g/Kg (Equivalente a 50 g/Kg de ingrediente activo)

Ingredientes Aditivos: Dodecil bencenosulfonato de calcio, ácido cítrico, lauril sulfato de sodio, silicato de sodio, carbonato de sodio, bentonita, ácido fosfórico, alcohol isopropílico, copolímero del ácido etileno-maleico, colorante amarillo 5, colorante amarillo 6, colorante rojo 40, agua desionizada c.s.p. 1 Kg

Aditivos c.s.p. 1 Kg

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3053

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

BERRACO 50 SG es un insecticida sistémico y de contacto para el control de plagas en diversos cultivos. Actúa por ingestión y contacto, con acción translaminar y sistémica, proporcionando un control prolongado. Es rápidamente absorbido por las raíces y hojas, distribuyéndose acropétalmente en la planta. Es efectivo contra insectos chupadores y masticadores en diferentes estadios de desarrollo. Se recomienda seguir las indicaciones de la tabla para una aplicación eficiente y segura.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (g/ha)	P.C.	P.R.
TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	GALLINA CIEGA (Larvas) <i>Phyllophaga spp.</i>	250 g/ha	14 días	6 horas
ALGODÓN	PULGONES DEL FOLLAJE (<i>Aphis spp.</i>) MOSCA BLANCA (<i>Bemisia tabaci</i>) PICUDO (<i>Anthonomus grandis</i>)	125 - 150 g/ha	14 días	6 horas

P.C: Periodo de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de personas y animales al área tratada.

Aditivos: c.s.p. completar la cantidad necesaria para obtener 1 Kg del producto formulado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar BERRACO 50 SG cuando se presenten las primeras infestaciones de la plaga, realizando un máximo de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. Se recomienda alternar con productos de diferente modo de acción para evitar resistencia.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

El volumen de aplicación es de 150 - 300 L/ha según el cultivo y equipo utilizado. Asegúrese de que el equipo esté en buen estado y correctamente calibrado para una aplicación uniforme.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. No obstante, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad antes de mezclar con otros productos.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

