

DIQUE

HERBICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

2,4D Ácido 2, 4-diclorofenoxiacético.....150g/L

PICLORAM Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolínico.....15g/L

Ingredientes Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2945

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

GENERALIDADES

DIQUE, es un herbicida recomendado para controlar malezas de hoja ancha, herbáceas y arbustivas, formulado en base a dos ingredientes activos: 2,4 - D que actúa incrementando la biosíntesis y producción de etileno causando una división celular incontrolada y daños en tejidos vasculares, y Picloram que es absorbido y traslocado, generando alteraciones en la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ha)	P.C	P.R
POTREROS	Algodoncillo (<i>Asclepias curassavica</i>) Pata de Toto (<i>Desmodium</i> sp) Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>) Tripa de Pollo (<i>Chamaesyce hirta</i>)	3.0	N/A	0 HORAS

N/A: No aplica

P.C.: PERÍODO DE CARENIA: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola.

P.R.: PERÍODO DE REENTRADA: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas a las áreas tratadas.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

DIQUE es un herbicida sistémico que debe aplicarse cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, condiciones que se presentan cuando se ha establecido el período de lluvias o cuando existe suficiente humedad en el suelo. Se puede aplicar en pre y post emergencia de las malezas, dependiendo de las exigencias del cultivo y de las características de las especies a controlar. El Picloram es de alta persistencia en el suelo (entre 2 y 3 años); por lo tanto, se debe tener cuidado al rotar con plantas dicotiledóneas. En pre emergencia de las malezas, se aplica en cobertura total del terreno con pastas luego de la siembra. El suelo debe estar bien preparado, libre de terrones y restos de cosecha y en buenas condiciones de humedad, ya que en suelo seco se reduce su eficacia. En Post emergencia de las malezas, aplicar preferiblemente en las fases iniciales de desarrollo o según la especie, hasta el estado adulto, con buen vigor vegetativo. Se debe evitar la aplicación sobre malezas agotadas, o cubiertas de polvo, en horas de intenso calor, humedad relativa menor de 60% y exceso de lluvias.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Agregue agua en el tanque de preparación hasta la mitad de su capacidad, vacíe el producto directamente al recipiente y mezcle bien mediante agitación mecánica. No es recomendable hacer mezclas con sustancias alcalinas.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

