

FIGARO 125 EC

HERBICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 916012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Fluazifop-p-butil Butil (R) 2-[4-[(5-trifluorometil)-2-piridil]oxi]fenoxipropionato, de formulación a 20°C.....125 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2654

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S. - AGROTRAC S.A.S.

PRECAUCIONES

FIGARO 125 EC es un herbicida sistémico post-emergente que es absorbido por vía foliar; se moviliza a fluazifop-P, el cual se transloca por xilema y floema acumulándose en los sitios meristemáticos de raíces y brotes en los que causa la inhibición de la síntesis de ácidos grasos, la cual interfiere en la síntesis de los ácidos grasos y de los fosfolípidos. FIGARO 125 EC resulta selectivo en cultivos de frijol y zanahoria.

Cultivo	Malezas a controlar	Dosis	P.C	P.R
FRIJOL (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>) Pasto Argentino (<i>Cynodon dactylon</i>) Lolium (<i>Lolium hirtum</i>) Guardamozo (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Poa (<i>Poa annua</i>) Arrocillo (<i>Echinochloa colonum</i>)	1.5 - 2.0 L/ha	N.A	0
ZANAHORIA (<i>Daucus carota</i>)	Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>) Leptoclorazon (<i>Echinochloa colonum</i>) Kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>) Guardamozo (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	1.5 - 2.0 L/ha	N.A	0

P.C.: Período de Carenia, intervalo entre la última aplicación y cosecha (días).

P.R.: Período de reentrada: Horas transcurridas entre la última aplicación y la entrada al área tratada.

N.A.: No aplica.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación de FIGARO 125 EC en post-emergencia temprana al cultivo. Aplicación de dosis bajas en las primeras fases del crecimiento de gramíneas perennes y dosis altas contra malezas anuales en fases de crecimiento avanzadas. Volumen de aplicación: 200 L/ha.

COMPATIBILIDAD

FIGARO 125 EC, es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes en el mercado, sin embargo se recomienda realizar una mezcla previa a pequeña escala para evaluar posibles incompatibilidades no aparentes. No es fitotóxico si se siguen las recomendaciones de dosis y uso dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO