

# FUTUR 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



**AGROTRAC**  
— CARIBE S.A.S. —

**AGROTRAC CARIBE S.A.S.**

 **KM 1 VÍA GALAPA – CENTRO LOGÍSTICO STOCK CARIBE**

 **[www.agrotraccaribe.co](http://www.agrotraccaribe.co)**

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

### INGREDIENTE ACTIVO

Thiodicarb (2E)-1,2,5,3,7,9,13-oktamethyl-6,11-dioxo-2,8,14-trithia-4,7,9,12-tetraazapentadec-3,12-diene-5,10 diona ..... 350 g/L

Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

## REGISTRO NACIONAL ICA No. 1134

Titular del Registro:

**AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.**

## INSTRUCCIONES DE USO

**FUTUR® 350 SC** por su ingrediente activo **THIODICARB** controla todas las especies de Lepidópteros y Coleópteros rasgones y algunas Hemipteros y Dípteros que son plagas del algodón y la papa.

Este insecticida por pertenecer a la segunda generación de insecticidas carbamatos, desempeña un papel importante como un producto alternativo y efectivo ratificándose y facilitándose, tanto en escala productiva de resistencia de los cultivos de algodón, papa y tabaco.

**FUTUR® 350 SC** es selectivo en su actividad, y su acción sobre insectos benéficos es mínima incluyendo abejas polinizas y predadores a las dosis prácticas de uso.

| CULTIVOS | PLAGAS                                               | DOSIS L/Ha | P.C.    | P.R.    |
|----------|------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| Papa     | Polilla Guatemalteca<br>( <i>Tecia solanivora</i> )  | 1.0 L/Ha   | 15 días | 4 horas |
| Maíz     | Gusano Cogollero<br>( <i>Spodoptera frugiperda</i> ) | 0.75 L/Ha  |         |         |

**P.C.:** Período de Carenia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**P.R.:** Período de Reentrada. Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas o animales.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

**FUTUR 350 SC**, se puede aplicar con los equipos convencionales que posean boquilla TX 1, TX 2, TX 6 o equivalentes. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto. Use agua limpia en volumen de 200 litros por hectárea.

## COMPATIBILIDAD

No es compatible con "carbamatos y carbamatos. Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

## RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DANINO**

