

INIMECTIN 1.8 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

AGROTRAC CARIBE S.A.S.

KM 1 VÍA GALAPA – CENTRO LOGÍSTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Abamectin: Mezcla de 80% (2aE,4E,5E,8E,10E,14E,16E)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,11S,12S,13S,17aR)-6'-(S)-sec-butyl-5',11,13-trihydroxy-6,6',12,14,16-pentamethyl-2'-oxospiro[2H,4H-pyrano[2,3-e]chromen-8,1'-cyclohexan]-2-yl (10Z,14E,16E)-(1'S,4'S,5'R,6S,6'R,8'S,11R,12R,13R,17aR)-5',11,13-trihydroxy-6'-(S)-sec-butyl-2',6,6',12,14,16-hexamethyl-2-oxospiro[2H,4H-pyrano[2,3-e]chromen-8,1'-cyclohexan]-2-yl]

2,4-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexapiranosyl-(1 $\rightarrow$ 4)-2,4-dideoxy-3-O-methyl- α -L-arabino-hexapiranoside . 18 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. PL0109102023

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.S

INSTRUCCIONES DE USO

INIMECTIN 1.8 EC es un insecticida-acaricida de acción translaminar, eficaz en el control de las especies ruchadoras de las siguientes. **INIMECTIN 1.8 EC** actúa por contacto e ingestión causando parálisis de la plaga. Es más efectivo en la época de larvas y ninfas pequeñas (L1 y L2). Esta acción perdura de 7 a 14 días después de la aplicación.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	P.C	P.R	LMR
ROSAS	ÁCAROS (<i>Tetranychus urticae</i>) (<i>Panonychus sp.</i>)	1.0 a 2.0 cc/L de agua. Diluir la dosis en suficiente agua para lograr una humedad que cubra toda la planta.	N.A.	4 horas	N.A.
FRIJOL	VAICITAS (<i>Liriomyza trifolii</i>) (<i>L. huidobrensis</i>)	700 cc/ha	14 Días	4 horas	0.02 mg/kg
ALGODÓN* UVA MANDARINO LIMÓN MANGO	ÁCAROS TDORTUGAS (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	800 cc/ha	14 Días	4 horas	0.02 mg/kg

P.C.: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de personas al área (depósitos) y el ingreso de ganado al área cultivo tratado.

NOTA: Preparar la cantidad de la mezcla según el área de aplicación. No aplicar en cultivos en etapa de floración ya que podría alterarse el proceso de polinización. No aplicar en cultivos de Arroz cuando la etapa de floración del cultivo se encuentre entre los estados 09 y 10 según la escala de Counce et.al. (2000). Aplicar con suficiente volumen para una cobertura adecuada. Mojar el envés de la hoja y los tallos donde se refugian los ácaros pequeños. Seguir las instrucciones del Ingeniero Agrónomo.

****** No aplica a la Resolución ICA No. 073867 del 28 de marzo de 2017.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Evitar la aplicación repetida que haga del control de este producto la base de un programa de monitoreo de la plaga.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

INIMECTIN 1.8 EC es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en pequeña escala antes de su aplicación en campo.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

