

INITHION® 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
— CARIBE S.A.S. —

Inithion®
50 EC



PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROMQUIM (COLOMBIA) (57) 1 283 8012 | 0180000 916012 | BOGOTÁ D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo

Dimetoato: O,O-dimetil S-metilcarbamilmetil fosforoditioato (equivalente a 400 g i.a./L a 20°C) 500 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3583

INSTRUCCIONES DE USO

INITHION® 50 EC, es un insecticida organofosforado de contacto e ingestión, de acción sistémica y translaminar, efectivo para el control de plagas en diversos cultivos. Se recomienda su aplicación según las dosis indicadas en la siguiente tabla.

Cultivo	Plaga a controlar	Dosis	PC	PR
Tomate	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	2.0 L/ha	7 días	4 horas
Cítricos (naranja)*	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.5 – 2.0 L/ha según severidad de la infestación (500 L de agua)	N.A.	
Algodón	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	1.25 – 2.0 L/ha	7 días	

PC: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

* Cítricos (naranja): No aplicar en limones, toronjas ni mandarinas.

NOTA: Respetar las dosis y recomendaciones de uso. Se recomienda usar el producto dentro de un programa de manejo integrado de plagas y alternarlo con insecticidas de diferente modo de acción para evitar resistencia. Antes de usar el producto, lea la etiqueta y siga las instrucciones de uso.

MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación de **INITHION® 50 EC**, en forma preventiva o cuando se detecten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. **INITHION® 50 EC** actúa rápidamente por contacto e ingestión, controlando las diferentes etapas del insecto en sus primeros estados de desarrollo. Para mejores resultados, efectuar la aplicación en horas de la mañana o al final de la tarde, evitando las horas de mayor radiación solar.