

KONQUER 480 SC

HERBICIDA AGRÍCOLA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: OCTUBRE 2024



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S

Carrera 16A No. 78 - 11 Of. 401 Bogotá D.C. – Colombia Teléfonos: (57) 7451524- 634 8391 - 634 8392
www.agrotrac.com

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

METRIBUZINA 480 g/L

Ingredientes Aditivos c.a.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3041

Distribuido por:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S. - AGROTRAC CARIBE S.A.S

GENERALIDADES

KONQUER 480 SC es un herbicida triazinona selectivo, sistémico con actividad por contacto y residual. Es principalmente absorbida por las raíces y hojas, inhibiendo la transferencia de electrones en la fotosíntesis. Para un control eficiente, el suelo debe mantenerse suficientemente húmedo.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	P.C.	P.R.
SOYA	Gramíneas y de hoja ancha*	1.0 L/ha	20 días	0 horas
ZANAHORIA		0.7 L/ha		

GRAMÍNEAS: Cebadilla (*Bromus tectorum*), Guardarrocio (*Digitaria sanguinalis*), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Píojoito (*Poa annua*).
HOJA ANCHA: Altamisa (*Artemisia artemisiifolia*), Batatilla (*Ipomoea* sp.), Bledo (*Amaranthus dubius*), Cazón de pastor (*Capsella bursa-pastoris*), Cerraja (*Coryza bonariensis*), Chilinchil (*Cassia tora*), Coloradita (*Verbena persica*), Susaliá (*Polygonum* spp.), Guasca (*Galinsoga ciliata*), Lengua de Vaca (*Rumex crispus*), Masturezo (*Lepidium virginicum*), Mona (*Spargula arvensis*), Nabo (*Brassica* spp.), Pajarera (*Stellaria media*), Senecio (*Senecio vulgaris*), Tomillo (*Mollugo verticillata*), Verdolaga (*Portulaca oleracea*).

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar una sola vez en la preemergencia del cultivo (cuando las malezas estén en crecimiento activo teniendo 1 a 3 hojas), dentro de un Programa de Manejo Integrado para evitar el desarrollo de resistencia.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de abanico y un tamaño de gota de 400 µm aprox.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evite mezclas con agentes fuertemente oxidantes, ácidos o básicos. Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.
No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos se recomienda realizar pruebas previas.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a los anotados en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

