

AGROTRÁC CARIBE S.A.S.

 KM 1 VÍA GALAPA – CENTRO LOGÍSTICO STOCK CARIBE
www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

loprothiolane (isopropyl N-[1,2-dithiolan-3-yl(iminio)carbonodithioyl]carbamate) (IUPAC) 400 g/L

Aditivos c.a.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA 2839

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROSER S.A.

INSTRUCCIONES DE USO

ORION, es un fungicida perteneciente al grupo de los phosphonothiolatos, es sistémico con acciones preventiva cuando se aplica con las condiciones propicias a la aparición de la enfermedad y curativa cuando ya hay incidencia de la misma. Es un inhibidor de la biosíntesis de fosfolípidos.

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS L/Ha	PC	PR
Arroz	AÑUBLO DE ARROZ <i>Pyricularia oryzae</i> Sacc.	1.5	14 DÍAS	4 HORAS

P.C.: PERIODO DE CARENCIA: intervalo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de aplicaciones pos cosecha se refiere al intervalo entre la última aplicación y el consumo del producto agrícola.

P.R.: PERIODO DE REENTRADA: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas o animales a las áreas tratadas.

EPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una aplicación al inicio del espigamiento o cuando se encuentren las condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No causa fitotoxicidad si se sigue las recomendaciones uso dadas

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase correspondan a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO