

AGROTRAC CARIBE SAS
KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE
www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Emamectin Benzoato (Avermectina B1a derivada) 18 g/L
Solvent nafta (Petróleo) (N° CAS 64742-94-5 de petróleo desparafinado hidrotratado) + 2-Ø[-1, (E)-dodecenil]-2-(2-butoxi)etoxi -1-etanol 79 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3223

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.S - AGROTRAC S.A.S

INSTRUCCIONES DE USO

PERSUASOR® SC es un Insecticida Semisolido con Base en los Ingredientes Activos Emamectin Benzoate (18 g/L) e Imidacloprid (18 g/L), con una Segunda composición de 79 g Producto no reconocido para el control de larvas de lepidópteros y trips en ornamentales. **PERSUASOR® SC** es un insecticida de tipo translaminar con Actividad por contacto e ingestión, que controla las principales larvas de lepidópteros plaga, afectando el aparato digestivo de los insectos, de acción tanto ovicida/larvicida como de ovicida ovicida avanza por la planta (planta (xilema y floema) y es translocada sistemacicante a las partes de la planta como bloqueador de los canales de sodio dependiente de voltaje. No aplicar el producto si las vallas han sido rasgadas o dañadas, para el total del material puede dañarse.

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.	LMR
Arroz	Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.4 L/ha	4 horas	14 días	Imidacloprid: 1.1 mg/kg Emamectin benzoate: 0.01 mg/kg
Tomate	Pasador del brote (<i>Heliothiopsis virescens</i>)	0.5 L/ha	4 horas	3 días	Imidacloprid: 1.1 mg/kg Emamectin benzoate: 0.01 mg/kg
ORNAMENTALES*					
Rosa	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.2 mL/L (2 cc/1 L de agua)	4 horas	N.A.	N.A.

P.R.: Período de reentrada: Intervalo entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada (horas).

P.C.: Período de Carencia. Intervalo entre la aplicación y la cosecha (días).

LMR: Límite máximo de residuos.

N.A.: No Aplica.

*Cultivos Ornamentales - Resolución 1418 del 11 de febrero de 2008.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

ARROZ: Se recomienda aplicar cuando se detecten los primeros individuos en los campos de arroz, para mayor control del barrenador.

TOMATE: Realizar hasta 2 aplicaciones consecutivas con un intervalo de 7 días entre ellas. La aplicación de **PERSUASOR® SC** se recomienda de forma rutinaria con el blanco biológico en campo y sin rotación con otros productos de manejo de fitosanitario.

ROSA: Realizar hasta dos (2) aplicaciones con un intervalo de 5 días entre ellas. Iniciar las aplicaciones al detectar el blanco biológico en campo y enfocado dentro de un programa de manejo fitosanitario, tener un volumen de 120 L de agua/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Antes de aplicar **PERSUASOR® SC** en mezcla con diferentes productos se deben realizar pruebas de incompatibilidad. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar prueba previa.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo Arroz: 200-300 L/ha; Rosas: 120-200 L/ha; Tomate: 800 L/ha; Use equipos de aspersión y una boquilla que produce la gota y logrará abarcar con cualquier equipo de aplicación terrestre, en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas". Si requiere mayor información comuníquese con el Titular del registro o con el distribuidor del producto"



PELIGRO

LIGERAMENTE PELIGROSO A