



PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 2886012 | Bogotá D.C.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA

## INGREDIENTE ACTIVO

DICLORURO DE PARAQUAT ..... 200 g/L

Ingredientes Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1772

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

## GENERALIDADES

QUEMAZONE® SL, es un herbicida no selectivo que actúa por contacto sobre las partes verdes de las plantas. No daña la corteza madura. No impide el rebrote de malezas perennes. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo.

Aplique QUEMAZONE® SL, en forma de aspersión mezclado con agua. No aplique a pleno sol.

Para obtener mejores resultados aplique QUEMAZONE® SL cuando las malezas estén creciendo vigorosamente, condiciones que se presentan cuando se ha establecido el período de lluvias o cuando existe suficiente humedad en el suelo.

## RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | MALEZA                                           | DOSIS    | P.C. | P.R.    |
|---------|--------------------------------------------------|----------|------|---------|
| ARROZ   | Clavito<br>( <i>Jussiaea linifolia</i> )         | 2.0 L/Ha | N.A. | 4 Horas |
|         | Liendre puerco<br>( <i>Echinochloa colonum</i> ) |          |      |         |
|         | Pata de gallina<br>( <i>Eleusine indica</i> )    |          |      |         |
|         | Barba de indio<br>( <i>Fimbristylis annua</i> )  |          |      |         |
|         | Falsa caminadora<br>( <i>Ischaemum rugosum</i> ) |          |      |         |
|         | Golondrina<br>( <i>Boerhavia erecta</i> )        |          |      |         |
|         | Arroz rojo<br>( <i>Oryza sativa</i> )            |          |      |         |
|         | Caminadora<br>( <i>Rottboellia exaltata</i> )    |          |      |         |
|         | Guarda rocío<br>( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) |          |      |         |
|         | Cadillo<br>( <i>Cenchrus echinatus</i> )         |          |      |         |
|         | Cortadera<br>( <i>Cyperus spp</i> )              |          |      |         |
|         | Siempre viva<br>( <i>Commelia diffusa</i> )      |          |      |         |
|         | Atarraya                                         |          |      |         |
|         |                                                  |          |      |         |
|         |                                                  |          |      |         |
|         |                                                  |          |      |         |
|         |                                                  |          |      |         |
|         |                                                  |          |      |         |

P.C.: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha.

P.R.: Período de reentrada.