

RELEVO® 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Fecha de actualización: Enero 2023



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.

AGROTRAC CARIBE SAS

KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Imidacloprid: 1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitro-2-imidazolidinimina (i.a.) 350 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 0001

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A - AGROTRAC S.A.S

INSTRUCCIONES DE USO

RELEVO® 350 SC es un insecticida sistémico de prolongada acción residual, para el control de insectos chupadores y masticadores. Se recomienda para su uso en los siguientes cultivos y de acuerdo con las siguientes recomendaciones de uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.	P.R.
ROSAS	Pulgón (<i>Macrosiphum rosae</i>)	250-350 c.c./ha	7 días	4 horas
MAÍZ	Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>)	150 c.c./ha	21 días	
TOMATE	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i> biotipo b)	250 c.c./ha	3 días	
ARROZ	Sogata (<i>Tagosodes orizicolus</i>)	150 c.c./ha	15 días	

MOMENTO DE APLICACIÓN

Lleve a cabo el tratamiento en forma preventiva o al llegar los primeros insectos y dependiendo la presión de la plaga. Para obtener un mejor control de la plaga, aplicar con un volumen de agua adecuado para lograr una buena cobertura.

COMPATIBILIDAD

RELEVO® 350 SC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común. No se fitotóxico en los siguientes cultivos si se usa de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

