

SOLARIS 500 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC

CARIBE S.A.S.

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A.
KM1 VIA GALAPA STOCK CARIBE CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

AZOXYSTROBIN 250 g/L

FLUTRIAFOL 250 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 3173

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC CARIBE S.A.S.

INSTRUCCIONES DE USO

SOLARIS 500 SC es un fungicida que contiene dos ingredientes activos en mezcla. Azoxystrobin pertenece al grupo químico de las estrobilurinas, y su mecanismo de acción consiste en inhibir la respiración mitocondrial en las células de los patógenos, deteniendo la transferencia de electrones entre el citocromo b y c1, el sitio de oxidación del ubiquinol, causando la no formación de ATP que es la fuente de energía para el hongo o bacteria. Flutriafol pertenece al grupo químico de los triazoles, su mecanismo de acción consiste en la inhibición de la C14-demetilasa en la ruta biosintética del ergosterol, el cual es un componente básico de las paredes celulares de los hongos. SOLARIS 500 SC es un fungicida de acción preventiva, curativa y erradicante. Se recomienda su uso en la prevención de las primeras síntomas de la enfermedad y cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la misma.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/ha	P.C. (DÍAS)	P.R	LMR
ARROZ	Complejo de Manchado del grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Rhynchosporium oryzae</i> , <i>Pyricularia</i> <i>sp.</i> , <i>Fusarium sp.</i> , <i>Curvularia sp.</i> , <i>Nigrospora sp.</i> <i>Aspergillus sp.</i>)	0.3	6	4 HORAS	Azoxystrobin: 0.5 Flutriafol: 1.5
TOMATE UCHUVA Tomate de árbol Pimentón Berenjena Aji Lulo	TIZON TEMPRANO (<i>Alternaria solani</i>)	0.2	3	4 HORAS	Azoxystrobin: 0.2 Flutriafol: 0.8

PC: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Periodo de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de plaguicidas y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (1) aplicación al momento de aparición de la enfermedad, dentro de un programa de manejo integrado, rotando con otras fungicidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

RESPONSABILIDAD

"El Titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

