

SPARTA 120 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA



AGROTRAC
CARIBE S.A.S.



SPARTA

120 SC

AGROTRAC CARIBE SAS

KM1 VIA GALAPA CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE

www.agrotraccaribe.co

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Spinosad: 120 g/L

Mezcla de Spinosyn A (2R,3aS,5S,6R,9S,13S,14R,15S,16R)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyl)-5-(dimethylamino)-3,3,4,5-tetrahydro-6-(hydroxymethyl)pyran-2-yl)-(2,3,3a,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,16a)-octahydro-1,4,7-trihydroxy-16-(4-methyl-1-piperazinio) -2,15-dioxo-3-[(2R,3aS,5R,6S,9S,13S,14R,16S,16aR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl- α -L-mannopyranosyl)-5-(dimethylamino)-3,3,4,5-tetrahydro-6-(hydroxymethyl)-2H-pyran-2-yl]oxyoxy]-9-ethyl-12-[(2S,4R,5S)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oolan-2-yl]oxy]-1,5-dioxacyclopentadec-7-ene.

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 2647

INSTRUCCIONES DE USO

SPARTA 120 SC es un insecticida que actúa sobre los receptores nicotínicos de la acetilcolina. Oscurece el sistema nervioso por alteraciones en la función nicotínica y los canales iónicos del GABA. Después de la eclosión los insectos muestran temblores, parálisis irreversible, hasta cesación a muerte. Actúa sobre los moduladores alostéricos de receptor nicotínico de acetilcolina (nAChR). Debido a que el ingrediente activo Spinosad solo se utiliza de manera localizada/inundada, ingresa al estomodeo, no se espera resistencia cruzada con insecticidas de este grupo. No rota con insecticidas con ingredientes activo Sobrerani.

Cultivo	Plaga a controlar	Dosis	PC	PR
Tomate	Cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	300 ml/ha	7 días	4 horas
Ornamentales* Rosa, pompón y Clavel**	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	100 ml/ha	N.A.	4 horas
Arándano***	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	400 cm ³ /ha (1 333 ml/cilindro producto)	3 días	4 horas
Aguacate	Trips (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> B.)	120 - 140 cm ³ /ha	1 día	4 horas

* Cultivos ornamentales de acuerdo a la Resolución 1418 del 11 de febrero de 2008.

** Dosis de 100-140 cm³/ha dependiendo la severidad de la plaga y del estado de desarrollo del cultivo; agitar el registro de cada aplicación durante 2 a 3 minutos de tal manera que se obtenga la mezcla de los ingredientes activos. Preparar la mezcla con el volumen de agua asignado para la calibración y adicionar la cantidad de agua restante, con el agitador en marcha. Consultar con un ingeniero agrónomo.

*** Aplicación de uso a través de mecanismo de minoría de uso, establecido en las Resoluciones ICA 075402 del 19 de septiembre de 2020 y 114003 del 3 de diciembre de 2021.