

VENDAVAL® 70 WG

HERBICIDA AGRÍCOLA

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1317



AGROTRAC

— CARIBE S.A.S. —

PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

METRIBUZIN 700 g/Kg

Ingredientes Aditivos c.s.p. 1 Kilogramo

GENERALIDADES

VENDAVAL® 70 WG, es un herbicida que se utiliza para el control en pre o post-emergente temprano de malezas gramíneas y de hoja ancha en cultivos de papa.

Es absorbido principalmente por las raíces; no obstante, puede ser absorbido a través del follaje en tratamientos de post-emergencia temprana. Se trasloca por el xilema, con movimiento acropétalo o ascendente, acumulándose en las hojas y tallos.

Actúa inhibiendo la reacción de Hill en la fotosíntesis. La selectividad se da por el posicionamiento de las raíces de las plantas cultivadas por debajo de la zona en que el producto se encuentra en el suelo así como por la menor velocidad de absorción y translocación en las plantas tolerantes. En ellas, es metabolizado por oxidación de la molécula en productos solubles, no tóxicos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	P.C.	P.R.
PAPA	Nabo (<i>Brassica spp</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Cerizo (<i>Chenopodium album</i>) Cebadilla (<i>Poa annua</i>) Cazón de pastor (<i>Capsela bursa-pastoris</i>) Bledo (<i>Amaranthus dubius</i>) Altamisa (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	0.5 – 0.75 Kg/Ha	N.A.	12 Horas
TOMATE	Trébol (<i>Trifolium spp</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>)	0.5 Kg/Ha	N.A.	12 Horas

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha.

P.R.: Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas o animales.

N.A.: No aplica.