



PARA EMERGENCIAS LAS 24 HORAS: CISPROQUIM (Colombia): (57) 1 288 6012 | 018000 918012 | Bogotá D.C.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO

Glufosinato de Amonio *Ammonium 4-hydroxy-(methyl) phosphinoyl-DL-homoalaninate* 150 g/L

Aditivos c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1499

Titular del Registro:

AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y EQUIPOS DE RIEGO S.A. - AGROTRAC S.A.

PRECAUCIONES

ZULU SL, es un herbicida no selectivo para aplicación en post-emergencia a las malezas anuales y perennes cuando tengan de 10 a 15 cm. de altura.

ZULU SL, es un herbicida para aplicación en pre-siembra al cultivo del arroz, se debe aplicar sobre malezas cuando estén en estado de crecimiento activo.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	P.C.	P.R.
ARROZ	PAPUNGA (<i>Bidens Pilosa</i>)	2.0 L/Ha Aplicación en pre-siembra al cultivo con malezas entre 10 y 15 cm. Sembrar después de 10 días de la aplicación.	N.A	0 horas
	EMILIA (<i>Emilia Sonchifolia</i>)			
	SUELDA CON SUELDA (<i>Commelina Diffusa</i>)			
	BLEDO (<i>Amaranthus Dubius</i>)			
	PATA DE GALLINA (<i>Eleusine indica</i>)			
	DIGITARIA (<i>Digitaria Sanguinalis</i>)			
	CAMINADORA (<i>Rottboellia Exaltata</i>)			
	PASTO JOHNSON (<i>Sorghum Halepense</i>)			
	PAJA MONA (<i>Leptochloa filiformis</i>)			
	BATATILLA (<i>Ipomoea Spp</i>)			
	VERDOLAGA (<i>Portulaca Oleracea</i>)			
	TAMARINDILLO (<i>Phyllanthus Niruri</i>)			
	PALO DE AGUA (<i>Luziola Spp</i>)			
	RODILLA DE POLLO (<i>Chamealyia Erecta</i>)			
	CAPERONIA (<i>Caperonia Palustris</i>)			
	DESMODIUM (<i>Desmodium Spp</i>)			
	RABO DE ALACRÁN (<i>Heliotropium Indicum</i>)			
	MASEGA (<i>Passalum Virgatum</i>)			
	YERBA DE SAPO (<i>Euphorbia Hirta</i>)			
	BOTONCILLO (<i>Borreria Latifolia</i>)			
	DORMIDERA (<i>Mimosa Pudica</i>)			
	CHILINCHIL (<i>Cassia Tora</i>)			

P.C.: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación del producto y la cosecha.

P.R.: Período de reingreso: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso al área tratada por personas o animales.

N.A.: No aplica



PLÁTANO Y BANANO	PAJA BERMUDA (Cynodon Dactylon)	1.5 L/Ha Aplicación en postemergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo	N/A	0 horas
	BLEDO (Amaranthus Dubius)			
	MALVA (Malachra Alceifolia)			
	PATA DE GALLINA (Eleusine indica)			
	RABO DE ZORRO (Setaria Geniculata)			
	GUARDARROCIO (Digitaria Sanguinalis)			
	PAJA AMERICANA (Echinochloa Colonum)			
	VERDOLAGA (Portulaca Oleracea)			
	YERBA DE SAPO (Euphorbia Hirta)			
	CORTADERA (Cyperus Ferax)			
	FALSA CAMINADORA (Ischaemum Rugosum)			
	BATATILLA (Ipomoea Volocea)			
	DORMIDERA (Mimosa Pudica)			
--- MAÍZ	EMILIA (Emilia Sonchifolia)	1.5 L/Ha Aplicación en postemergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo	N/A	0 horas
	SIEMPREVIVA (Commelina Diffusa)			
	CLAVITO (Jussiaea Linifolia)			
	PATA DE GALLINA (Eleusine indica)			
	LENDRE PUERCO (Echinochloa Colonum)			
	PAJAMONA (Leptochloa Filiformis)			
	TAMARINDILLO (Phyllanthus Niruri)			
	PALO DE AGUA (Ludwigia Spp)			
	COQUITO (Cyperus Rotundus)			
	BICHO (Cassia Tora)			
	BLEDO (Amaranthus Sp)			
	DORMIDERA (Mimosa Pudica)			
	GUALOLA (Polygonum Hydropiperoides)			
	PEGA PEGA (Desmodium Tortuosum)			
	BATATILLA (Ipomoea Congesta)			
	ORTIGA (Urtica Urens)			
	VERDOLAGA (Portulaca Oleracea)			
	PATA DE GALLINA (Digitaria Sanguinalis)			
	CAMINADORA (Rottboellia Exaltata)			
	PASTO JOHNSON (Sorghum Halepense)			
CAFÉ	SUELDA CON SUELDA (Commelina diffusa)	1.5 L/Ha	N/A	0 Horas
	EMILIA (Emilia sonchifolia)			
	ORTIGA (Urtica urens)			

	BATATILLA (Ipomoea congesta)	Hacer una aplicación a dosis de 1.25 L/ha cuando las malezas de un máximo de 3 hojas verdaderas.	N/A	0 Horas
	CORTADERA (Cyperus ferax)			
	BOLSA DE PASTOR (Capsella bursa pastoris)			
	PAJA MONA (Leptochloa filiformis)			
	PASTO GUINEA (Panicum maximum)			
	GOLONDRINA (Boerhavia erecta)			
	HELECHO (Pteridium aquilinum)			
	RABANO (Raphanus sativus)			
	ARTEMISA (Artemisia vulgaris)			
	LECHOSA (Euphorbia hirta)			
AGUACATE	FALSO TREBOL (Oxalis sp)	Hacer una aplicación a dosis de 1.50 L/ha cuando las malezas tengan una altura máxima de 6 cm	N/A	0 Horas
	CAPERONIA (Caperonia palustris)			
	BORLITAS (Emilia sonchifolia)			
	CADILLO (Bidens pilosa)			
	DYMARIA (Dymaria cordata)			
	PASTO YARAGUA (Melinis minutiflora)			
	BLEDO (Amaranthus SP)			
	PATA DE GALLINA (Eleusine indica)			
	VENADILLO (Conyza bonariensis)			

MOMENTO DE APLICACIÓN

- **ARROZ:** Aplíquese en Pre-siembra al cultivo con malezas entre 10 y 15 cm.
- **PLÁTANO Y BANANO:** Aplíquese en post-emergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo con malezas entre 10 y 15 cm.
- **MAÍZ:** Aplíquese en post-emergencia dirigida a las malezas entre calles del cultivo con malezas entre 10 y 15 cm.
- **CAFE:** Aplicar en las calles del cultivo con las malezas en crecimiento activo.

COMPATIBILIDAD

ZULU SL, no se debe mezclar sin antes realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación. Si se utiliza este producto a las dosis y cultivos recomendados en esta etiqueta no se espera que se presenten problemas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase correspondan a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

